

Infacol

40 mg/ml orale suspensie/suspension orale/Suspension zum Einnehmen
SIMETICON/SIMÉTICONE

Gebruiksaanwijzing

INFACOL is verkrijgbaar in een 50 ml verpakking.

Indicatie

INFACOL orale suspensie wordt gebruikt voor de behandeling van buik- en darmkrampjes bij kinderen. De pijn die geassocieerd wordt met buik- en darmkramp kan veroorzaakt worden door de opbouw van kleine gasbellen die in de darmen vastzitten. Infacol helpt vastzittende lucht te bevrijden. Het kan vanaf de geboorte en voor onbepaalde tijd gebruikt worden.

Werkingsmechanisme

INFACOL bevat simeticon met een concentratie van 40 mg/ml als hoofdbestanddeel. Simeticon is een antiflatulent, die helpt vastzittende lucht in de buik te bevrijden. Simeticon zorgt er voor dat de kleine gasbellen samensmelten tot grote gasbellen die makkelijk door uw baby als lucht kunnen worden afgevoerd.



Wijze van gebruik

Schud eerst het flesje. Vul de pipet door twee keer in het rubberen ballonnetje te knijpen. Veeg de overtollige vloeistof aan de buitenzijde van de pipet af aan de binnenzijde van het flesje. Om toe te dienen, knijp in het rubberen ballonnetje en druppel de INFACOL achter op de tong van uw baby. Het flesje bevat ongeveer 100 doses.

Dosering

Een gevulde pipet (0,5 ml) voor elke voeding toediening. Indien noodzakelijk kan dit tijdelijk verhoogd worden tot twee gevulde pipetten (1 ml). Gebruik INFACOL gedurende een aantal dagen voor het beste resultaat.

Gebruik gedurende langere tijd kan de ophoping van gas helpen voorkomen.

Waarschuwing

INFACOL simeticon is inert en wordt niet in het lichaam opgenomen. Van INFACOL zijn geen bijwerkingen bekend.

Methyl hydroxybenzoate en propyl hydroxybenzoate kunnen (eventueel vertraagde) allergische reacties geven.

Als u denkt dat uw baby allergisch is voor één van de bestanddelen, vraag dan voor gebruik advies aan uw arts of apotheker.

Raadpleeg een arts als de symptomen niet verbeteren.

Bewaring en houdbaarheid

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op het flesje en de doos.

Gebruik binnen 28 dagen na opening.



medisch hulpmiddel

Afvoeren volgens lokale wet- en regelgeving.

Mode d'emploi

INFACOL est disponible en flacon de 50 ml.

Indications

INFACOL suspension orale est utilisé dans le traitement des crampes abdominales et intestinales chez l'enfant. La douleur associée aux coliques peut être provoquée par la formation de petites bulles d'air dans les intestins. Infacol aide à évacuer ces gaz.

Il peut être utilisé dès la naissance sans limitation de durée.

Action

INFACOL contient de la siméticone à une concentration de 40 mg/ml comme composant principal. La siméticone est un antifatulent, qui aide à évacuer l'air emprisonné dans l'estomac. La siméticone permet que les petites bulles d'air se réunissent en une grande bulle d'air, laquelle votre bébé peut s'échapper plus facilement. .



Mode d'administration

Agitez préalablement le flacon. Remplissez la pipette en pressant à deux reprises le capuchon en caoutchouc. Éliminez l'excédent de produit le long de la pipette en passant celle-ci sur le rebord du goulot. Pour administrer Infacol, pressez le capuchon en caoutchouc et déposez les gouttes sur la langue de votre bébé. Le flacon contient environ 100 doses.

Posologie

Administrer une pipette remplie (0,5 ml) avant chaque repas. Au besoin, cette dose peut être temporairement portée à deux pipettes remplies (1 ml). Utilisez INFACOL pendant plusieurs jours consécutifs pour un meilleur résultat. L'utilisation sur une certaine durée peut aider à prévenir l'accumulation de gaz.

Avertissements

INFACOL siméticone est inerte et n'est pas assimilé par l'organisme. INFACOL ne possède aucun effet secondaire connu. Le méthyle hydroxybenzoate et le propyle hydroxybenzoate peuvent entraîner des réactions allergiques (éventuellement différées). Si vous pensez que votre bébé est allergique à l'un des composants, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant toute utilisation.

Vous devez vous adresser à votre médecin, si les symptômes ne s'améliorent pas.

Conseils de conservation et durée de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon et l'emballage.
Conserver 28 jours après ouverture.



dispositif médical

Éliminer conformément aux lois et réglementations locales.

Gebrauchsanweisung

INFACOL ist in einer 50-ml-Packung erhältlich.

Anwendungsgebiete

INFACOL orale Suspension wird zur Behandlung von Behandlung von Koliken und krampfartigen Schmerzen bei Kindern angewendet. Die Schmerzen, die mit Bauch- und Darmkrämpfen einhergehen, werden durch die Ansammlung von im Bauch festsitzenden Gasbläschen verursacht. Infacol hilft, diese festsitzende Luft zu lösen.

Es kann ab der Geburt und über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Wirkmechanismus

INFACOL enthält Simecon mit einer Konzentration von 40 mg/ml als Hauptbestandteil. Simecon ist ein Entschäumer und hilft, festsitzende Luft im Bauch zu lösen. Simecon sorgt dafür, dass die Gasbläschen zu großen Gasblasen zusammengefügt werden, die leicht als Luft abgeführt werden können.



Art der Anwendung

Schütteln Sie zuerst die Flasche. Füllen Sie die Pipette, indem Sie zweimal in den Gummi-Saugball zusammendrücken. Wischen Sie überschüssiges Material an der Außenseite der Pipette an der Flascheninnenseite ab. Zum Verabreichen: durch das Drücken des Gummiballs Infacol hinten auf die Zunge Ihres Babys träufeln. Die Flasche enthält ca. 100 Dosierungen.

Dosierung

Eine gefüllte Pipette (0,5 ml) vor jeder Mahlzeit verabreichen. Falls erforderlich, kann diese Dosis vorübergehend auf zwei gefüllte Pipetten (1 ml) erhöht werden. Verabreichen Sie INFACOL einige Tage, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Eine längere Verabreichung kann dazu beitragen, die Ansammlung von Gasen zu verhindern.

Warnhinweise

INFACOL Simeticon ist inert und wird nicht vom Körper aufgenommen. Von INFACOL sind keine Nebenwirkungen bekannt. Methylhydroxybenzoat und Propylhydroxybenzoat können (eventuell verzögerte) allergische Reaktionen auslösen. Wenn Sie glauben, dass Ihr Baby allergisch auf einen der Bestandteile reagiert, fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn die Symptome über einen längeren Zeitraum anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Aufbewahrung und Dauer der Haltbarkeit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht nach dem auf der Flasche und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum verwenden.

Nach dem Öffnen 28 Tage haltbar.



Medizinprodukt

Gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.



Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Germany

Distributeur/Vertreiber:

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Laatste herziening bijsluiter: 09.2022

Dernière révision de la notice: 09.2022

Letzte Überarbeitung der Packungsbeilage: 09.2022

